Carni e sicurezza

Simona Lauri OdG Milano

Intervista al Dott. Claudio Poli
biotecnologo, chimico industriale, ricercatore
e analista

Questo mese ho fatto una chiacchierata con un professionista estremamente preparato ma altrettanto riservato, scrupoloso, umile e poco amante delle interviste, dei discorsi pubblici e delle piazze virtuali e non.

Non ama assolutamente i social, ma la tranquillità di un laboratorio nel quale può godere dell'immensa passione che gli trasmette il suo lavoro.

La sua grande professionalità e immensa cultura scientifica fanno sì che sia uno dei migliori biotecnologi, microbiologi,

tecnici e analisti del settore alimentare.

E' difficile trovare le parole per presentare un professionista come lui; prendo spunto quindi dal suo curriculum partendo solo dai soli titoli accademici. **Master in biotecnologie degli alimenti. Sapienza Università di Roma e Laurea in Chimica Industriale** sempre presso Sapienza Università di Roma, **ricercatore in biotecnologie degli impasti acidi e fermentazioni naturali**, relatore tecnico scientifico su argomenti accademici (chimica, fisica, biologia, entomologia, ingegneria alimentare, igiene e prevenzione, bromatologia),

analista chimico industriale e microbiologo degli alimenti e...

Ringrazio immensamente il **Dott. Poli** per avermi concesso questa rara intervista nella quale traspaiono un'**immensa scrupolosità e attenzione ai dettagli** come solo un amante del suo lavoro può fare ed essere.

Il suo lavoro principalmente riguarda le analisi

microbiologiche aziendali su matrici alimentari; controlli atti a garantire il rispetto del protocollo HACCP di sicurezza aziendale e quindi sicurezza per il consumatore. Quali sono, se esistono, gli eventuali pericoli/rischi microbiologici ai quali può incorrere il consumatore se l'azienda non rispetta il rigoroso protocollo microbiologico per esempio nel settore delle carni e dei prodotti carnei?

Durante la macellazione la contaminazione batterica è inevitabile. Tuttavia, **l'impiego di buone tecniche igieniche permette di limitare queste contaminazioni** secondarie e ottenere valori finali di conta batterica totale ottimali ($< 10^4$ UFC/cm² in carcasse di bovini , $< 10^5$ UFC/ cm² in carcasse di pecora e suino). **Lo stordimento può essere effettuato con pistola a proiettile captivo** (bovini, suini pesanti e pecore), stordimento

elettrico (suini e pecore) o talvolta con l'uso di CO₂, **che riduce l'incidenza di carni PSE in suini.**

Misure igieniche e buone prassi di lavorazione insufficienti permettono la colonizzazione delle superfici e delle attrezzature da parte di microrganismi tipici dell'ambiente dell'animale ("house flora") e di conseguenza producono contaminazioni crociate difficili da controllare tra carcassa e carcassa.

È ormai assodato che patogeni quali ***L. monocytogenes*** diversi patotipi di ***E. coli*** e la stessa ***Salmonella*** possano produrre glicocalice e biofilm su ogni tipologia di superfici, rendendole aree di diffusione microbica.

La carne è una possibile fonte di microrganismi patogeni.

Salmonella spp., *E. coli* O157:H7, *Campylobacter* spp. derivano dall'intestino e **persistono durante la conservazione della carne fresca**, rappresentando un pericolo per il consumatore nel caso di **consumo di carne cruda o malcotta**.

Negli anni sono stati denunciati **numerosi casi di tossinfezione da *Campylobacter* causati da hamburger o carni cotte alla brace.**

Salmonella enteritidis, *S. typhimurium* e altri sierotipi sono normalmente presenti nelle **carni suine e avicole** e in alcune aree geografiche l'incidenza può raggiungere anche il 100%. **Nonostante i tentativi di eradicazione dagli allevamenti, si ritiene che *Salmonella* sia presente nel 40% delle carni agricole e suine.** *Campylobacter*, nonostante sia largamente presente nelle carni agricole, essendo un commensale intestinale di

numerose specie animali , non desta preoccupazione in Italia . Al contrario, **in nazioni come la Gran Bretagna e Stati Uniti , è stata osservata un'incidenza maggiore di patologie causate da *Campylobacter* (*campylobacteriosi*)** rispetto alla salmonellosi.

Del resto, 61-70% dei ceppi umani di *Campylobacter* corrisponde a quelli degli animali da carne. *C.jejuni* e *C.coli* sono frequenti in carne di pollame (quasi il 100%). **Nelle carni rosse** (suine e bovine) **la sua presenza è**

limitata dalla competizione con altri microrganismi. Viceversa in queste carni si possono trovare numerose patogeni di *E.coli*, e in particolare *E.coli* produttori di Verocitossina (VTEC-*E.coli* O157:H7). ***L. monocytogenes* è un microrganismo ambientale normalmente presente sulle carni** , ritenuto responsabile di infezioni nel consumatore. **La sua incidenza varia dal 10% al 40% delle carcasse suine e bovine.** Microrganismo psicotrofo, cresce a temperature di refrigerazione seppur in tempi lunghi (tempo di generazione > 2-3 giorni),

sopravvive al congelamento, ma è facilmente distrutto dal calore (abbattimento di 6 log con pastorizzazione a 72 °C 15 secondi).

***Yersinia enterocolitica* invece può essere isolata prevalentemente da carni rosse**, dove si può sviluppare durante la refrigerazione essendo psicrotrofa.

In passato ha causato problemi per il consumo di carni crude e malcotte. È inattivata sia dalla cottura sia dal processo di maturazione dei prodotti derivati. **Un altro patogeno**

ubiquitario normalmente presente nelle carni crude è ***Aeromonas hydrophila*** che **cresce raramente nelle carni refrigerate** perché trova la competizione di altri microrganismi (*Pseudomonas*, *Shewanella*, *Proteus*, *Enterobacter*).

Tra i patogeni Gram- positivi ricordiamo *Staphylococcus aureus*, *Clostridium botulinum* e *Clostridium perfringens*. Il primo deriva dalle mucose degli animali (pelle), è un mesofilo e di conseguenza

non si sviluppa sulle carni crude refrigerate. **Le carni sono state spesso ritenute responsabili di tossinfezione stafilococcica**, tuttavia gli alimenti incriminati sono stati "sandwich" con **carni cotte o malcotte** (temperature <60 °C a cuore) contenenti uova, salse, fortemente manipolate dall'uomo e conservate in abuso termico (> 20°C). **L'incidenza di Clostridium botulinum è molto bassa nelle carni.** I casi d'intossicazioni sono rarissimi, perché difficilmente cresce nelle carni fresche essendo anaerobico

stretto. **Clostridium perfringens è invece parte della popolazione intestinale degli animali**, pur non essendo considerato autoctono dell'intestino e **scorrette macellazioni lo possono portare nel muscolo. Producendo oospore resistenti al calore, è fondamentale l'abbattimento rapido** della temperatura dopo cottura altrimenti le spore potrebbero germinare e produrre le tossine.

La riduzione della carica

POLLO DISOSSATO
 CON FRITTATA E PROSCIUTTO COTTO
12,99
 Al kg €

POLLO
 CON FORMAG

DISOSSATO
GGIO E PROSCIUTTO COTTO
Al kg € **12,99**

CONIGLIO DISOSSATO
CON FORMAGGIO E PROSCIUTTO COTTO

~~25,18~~ SCONTI 20% ALI € **20,15**

batterica totale e dei patogeni può essere incrementata attraverso diversi approcci metodologici.

Accanto a metodologie strettamente fisiche, vengono considerati metodi chimici e microbiologici che non possono assolutamente sostituirsi o risolvere i problemi di scarsa igiene.

Fra i metodi fisici più

innovativi troviamo: gli ultrasuoni o suoni a bassa frequenza, le radiazioni infrarosse, le alte pressioni, il lavaggio delle carcasse con acqua a 75°C in alta pressione, radiazioni ionizzanti, ecc., mentre tra i chimici s'impiega cloro o trisodiofosfato, acqua ossigenata, ecc.